



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

---

Мјесечни агрометеоролошки билтен за септембар 2021.



*Бања Лука, октобар 2021.*



## НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ У СЕПТЕМБРУ

Септембар 2021. на подручју Републике Српске први дио септембра обиљежило је суво и топло вријеме.

\*

Другу половину карактерисало је промјенљиво вријеме са честом појавом кише и пљускова.

\*

У већем дијелу септембра временске прилике су биле повољне да се обаве актуелни пољопривредни радови.

септембар 2021.	Температуре ваздуха				Количина падавина		Температура земљишта на 5 cm		Температура земљишта на 20 cm		Влажност ваздуха %		Инсола ција h
	Макс.	Мин.	Сред.	Мин. 5cm	R mm	BCcm	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	
Бања Лука	34.5	5.0	17.9	3.9	32.3	-	28.8	11.6	22.5	15.2	98	21	241.5
Приједор	33.6	4.4	17.1	4.0	50.6	-	25.4	12.3	22.7	15.9	88	60	226.1
Србац	31.6	4.9	16.5	-	32.3	-	-	-	-	-	86	55	-
Бијељина	33.2	6.0	18.0	4.3	4.1	-	31.4	11.8	24.4	16.0	89	62	235.1
Соколац	27.3	-2.4	12.9	-3	35.8	-	23.9	5.6	19.0	11.2	95	27	223.7
Добој	33.3	4.9	17.6	3.3	7.3	-	28.4	12.2	22.5	16.9	98	27	192.1
Требиње	30.5	9.7	20.3	8.3	31.1	-	-	-	-	-	96	29	-
Нови Град	33.1	5.1	16.9	5.8	40.5	-	-	-	-	-	93	32	-
Чемерно	24.8	2.6	12.6	-	43.3	-	-	-	-	-	100	28	225.2
Вишеград	31.8	5.8	16.8	4.4	30.2	-	-	-	-	-	87	53	-
Мркоњић Град	31.0	3.4	15.4	1.0	30.4	-	23.8	10.6	20.4	14.4	96	22	185.3

Табела 1 - Преглед метеоролошких података за најважније станице за септембар 2021. године




## ТОПЛОТНИ УСЛОВИ У СЕПТЕМБРУ

- ▶ Средња мјесечна температура ваздуха кретала се од 12,6 у Хан Пијеску и Чемерну; 12,9 Сокоцу и Калиновику до 20,3<sup>0</sup>С у Требињу. Одступање средње температуре у односу на вишегодишњи просјек износило је од +1,2 у Билећи до -1,3<sup>0</sup>С у Сребреници.
- ▶ Током већег дијела мјесеца јутарње температуре су биле веће од просјека.
- ▶ Минимална температура ваздуха у већини мјеста забиљежена је у првој половини треће декаде мјесеца (22. и 24. септембра).
- ▶ Минималне вриједности у нижим предјелима износиле су око 5, на југу Херцеговине до 10, у вишим подручјима од -2 до 3<sup>0</sup>С.



## ТОПЛОТНИ УСЛОВИ У СЕПТЕМБРУ



- ▶ Највише дневне температуре у већини мјеста забиљежене су средином мјесеца (15. септембра), у нижим предјелима имале су вриједности од 32 до 34, у планинским од 25 до 28°C.






## ТОПЛОТНИ УСЛОВИ У СЕПТЕМБРУ

- ▶ Временске прилике у овом дијелу одговарале су за коначно зрење, жетву, брање пристиглих ратарских култура, воћа, поврћа и грозђа.






## ТОПЛОТНИ УСЛОВИ У СЕПТЕМБРУ

- ▶ Бања Лука и Бијељина су имале највишу инсолацију у септембру.



Слика 4 - Инсолација (h) за септембар 2021.године




## ПАДАВИНЕ

- ▶ У септембру прилив падавина био је неуједначен и знатно мањи од вишегодишњег просјека.
- ▶ Падавине су забиљежене почетком мјесеца и у већем дијелу друге половине септембра. Интензивније и чешће регистроване су у периоду од 17 до 24 септембра.
- ▶ Доспјеле падавине су се кретале од 4 колико је измјерено у Бијељини до 54 l/m<sup>2</sup> у Калиновику.
- ▶ Највећу количину падавина током прве декаде септембра мјери Сребреница 7; друге Фоча и Калиновик 50; треће Сребреница 15 l/m<sup>2</sup>.



## ПАДАВИНЕ

- ▶ Ове падавине су добро дошле, али су недовољне да би у знатној мјери поправиле стање влаге како у површинском, тако и у дубљим слојевима земљишта.
- ▶ Залихе влаге у свим производним крајевима су неповољни као последица недостатка већих количина падавина током љета.







## УСЛОВИ ЗА ПОЈАВУ И ШИРЕЊЕ БОЛЕСТИ



Слика 1 - Мјехураста гар кукуруза

- ▶ У другом дијелу мјесеца због појаве падавина дошло је до појаве биљних болести у усјевима кукуруза, гдје је регистровано присуство симптома мјехурасте гари кукуруза.



## АКТИВНОСТИ ИНСЕКТА



Слика 2- Репичина лисна оса


- ▶ У првој половини септембра топло и суво вријеме повољно је утицало на активност штеточина. Код кукуруза је регистровано присуство памукове совице и кукурузног пламенца.
- ▶ На усјевима уљане репице примијећено је присуство гусеница репичине лисне осе.
- ▶ Код воћарских култура, у засадима јабуке регистрована је појава пиљења ларви треће генерације јабукиног смотавца, као и колоније крваве ваши.



## ПОЉОПРИВРЕДНИ РАДОВИ

- ▶ У већем дијелу септембра временске прилике су биле повољне да се обаве актуелни пољопривредни радови, као што су: жетва сунцокрета, берба кукуруза, грожђа, воћа и поврћа.





# Мјесечни агрометеоролошки билтен

септембар 2021.

► *Израдили:*

*Дејан Супић, руководилац Одсјека за агрометеорологију*

*Инес Ђурић, виши стручни сарадник за агрометеорологију*